

## KISA ÜRÜN BİLGİSİ

### 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CAPETABİN 500 mg film kaplı tablet

### 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

#### Etkin madde:

Kapesitabin: 500 mg

Bir film kaplı tablet 500 mg kapesitabin içerir.

#### Yardımcı madde(ler):

Her film kaplı tablet 50.5 mg anhidr laktoz ve 20.0 mg kroscarmelloz sodyum içerir.

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1.'e bakınız.

### 3. FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet

CAPETABİN; şeftali renkli, iki yüzü düz, oblong şeklinde, bikonveks film kaplı tablettir

### 4. KLİNİK ÖZELLİKLER

#### 4.1 Terapötik endikasyonlar

##### Meme kanseri

CAPETABİN lokal ilerlemiş ya da metastatik meme kanseri olan hastaların tedavisinde, antrasiklin içeren sitotoksik tedavinin başarısız olmasından sonra ya da antrasiklin kullanımının kontrendike olduğu durumlarda taksanlar ile kombine olarak; taksan ve antrasiklin tedavisi almış hastalarda ise monoterapi olarak endikedir.

##### Kolon, kolorektal kanser

Erken evre opere edilmiş evre III, lenf nodu metastazı bulunan kolon kanserli hastaların adjuvant tedavisinde okzaliplatinle kombine olarak kullanımı endikedir.

Metastatik kolorektal kanserli hastaların tedavisinde endikedir.

##### Mide kanseri

Metastatik ya da inoperabl mide adeno kanserli hastalarda sisplatinle kombinasyon halinde endikedir.

#### 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

CAPETABİN yalnızca antineoplastik tıbbi ürünlerin kullanımı konusunda deneyimli yetkin bir hekim tarafından reçete edilmeli ve tüm hastalar tedavinin özellikle ilk siklusu boyunca yakından izlenmelidir.

## Pozoloji ve uygulama sıklığı ve süresi:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

### Monoterapi

Kolon, kolorektal ve meme kanseri:

Önerilen CAPETABİN monoterapi dozu, 2 hafta boyunca günde iki kez uygulanan 1250 mg/m<sup>2</sup> (sabah ve akşam; toplam 2500 mg/m<sup>2</sup> günlük doza eşdeğer) ve bunu izleyen 7 günlük dinlenme dönemidir.

### Kombinasyon tedavisi

Meme kanseri:

Önerilen CAPETABİN başlangıç dozu, 2 hafta süreyle günde iki kez 1250 mg/m<sup>2</sup>'dir ve bunu 7 günlük bir dinlenme dönemi izler; bunun yanı sıra her 3 haftada bir 1 saatlik intravenöz infüzyon şeklinde 75 mg/m<sup>2</sup> dosetaksel verilir.

CAPETABİN - dosetaksel kombinasyonu verilen hastalarda dosetaksel uygulamasından önce, dosetaksel uygulama bilgileri doğrultusunda premedikasyon uygulanmalıdır.

Kolon, kolorektal ve mide kanseri:

Kombinasyon tedavisinde, önerilen CAPETABİN başlangıç dozu, 2 hafta süreyle günde iki kez 800 ila 1000 mg/m<sup>2</sup>'ye düşürülmelidir. Bunu 7 günlük bir dinlenme dönemi izler veya devamlı uygulanacaksa günde iki kere 625 mg/m<sup>2</sup> kullanılmalıdır (daha fazla bilgi için Klinik/Etkinlik çalışmaları bölümüne bakınız). Kombinasyon rejimine biyolojik ajanların dahil edilmesinin CAPETABİN'in başlangıç dozuna hiçbir etkisi yoktur. Evre III kolon kanserli hastalar için adjuvan tedavi olarak toplam 6 ay kullanılması tavsiye edilir.

CAPETABİN ve sisplatin veya oksaliplatin kombinasyonu alan hastalara sisplatin ve oksaliplatin uygulanmadan önce, sisplatin ve oksaliplatin ürün bilgisine göre yeterli hidrasyon ve kusmanın önlenmesini sağlamak için premedikasyon başlatılmalıdır.

CAPETABİN dozu vücut yüzey alanına göre aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. Aşağıdaki tablolar, CAPETABİN'in ya 1250 mg/m<sup>2</sup> ya da 1000 mg/m<sup>2</sup> için standart ve azaltılmış doz hesaplamaları örneklerini gösterir (bkz. "Tedavi sırasında doz uyarlamaları").

Tablo 1. Vücut Yüzey Alanına Göre Standart ve Azaltılmış CAPETABİN 1250 g/m<sup>2</sup> Başlangıç Dozu Hesaplamaları

|   | 1250 mg/m <sup>2</sup> Doz Düzeyi (günde 2 kez) |  |        |  |  |
|---|---|--|--------|--|--|
|   | Tam doz<br>1250 mg/m <sup>2</sup>               | Her uygulama için<br>alınacak 150 mg tablet ve/veya<br>500 mg tablet sayısı (her<br>uygulama sabah ya da akşam<br>verilir) |        | Azaltılmış<br>doz<br>(% 75)<br>950 mg/m <sup>2</sup> | Azaltılmış<br>doz<br>(% 50)<br>625 mg/m <sup>2</sup> |
| Vücut<br>yüzey<br>alanı (m <sup>2</sup> ) | Her<br>uygulamada<br>alınacak doz<br>(mg)       | 150 mg   | 500 mg | Her<br>uygulamada<br>alınacak doz<br>(mg)            | Her<br>uygulamada<br>alınacak doz<br>(mg)            |
| ≤ 1.26                                    | 1500  | -  | 3      | 1150   | 800  |

|             |      |   |   |      |      |
|-------------|------|---|---|------|------|
| 1.27 - 1.38 | 1650 | 1 | 3 | 1300 | 800  |
| 1.39 – 1.52 | 1800 | 2 | 3 | 1450 | 950  |
| 1.53 – 1.66 | 2000 | - | 4 | 1500 | 1000 |
| 1.67 - 1.78 | 2150 | 1 | 4 | 1650 | 1000 |
| 1.79 – 1.92 | 2300 | 2 | 4 | 1800 | 1150 |
| 1.93 – 2.06 | 2500 | - | 5 | 1950 | 1300 |
| 2.07 – 2.18 | 2650 | 1 | 5 | 2000 | 1300 |
| ≥ 2.19      | 2800 | 2 | 5 | 2150 | 1450 |

Tablo 2. Vücut Yüzey Alanına Göre Standart ve Azaltılmış CAPETABİN 1000 g/m<sup>2</sup> Başlangıç Dozu Hesaplamaları

| 1000 mg/m <sup>2</sup> Doz Düzeyi (günde 2 kez) |   |  |        |  |  |
|---|---|--|--------|--|--|
|   | Tam doz<br>1000 mg/m <sup>2</sup>         | Her uygulama için<br>alınacak 150 mg tablet ve/veya<br>500 mg tablet sayısı (her<br>uygulama sabah ya da akşam<br>verilir) |        | Azaltılmış<br>doz<br>(% 75)<br>750 mg/m <sup>2</sup> | Azaltılmış<br>doz<br>(% 50)<br>500 mg/m <sup>2</sup> |
| Vücut<br>yüzey<br>alanı (m <sup>2</sup> )       | Her<br>uygulamada<br>alınacak doz<br>(mg) | 150 mg   | 500 mg | Her<br>uygulamada<br>alınacak doz<br>(mg)            | Her<br>uygulamada<br>alınacak doz<br>(mg)            |
| ≤ 1.26  | 1150                                      | 1  | 2      | 800  | 600  |
| 1.27 - 1.38                                     | 1300                                      | 2  | 2      | 1000   | 600  |
| 1.39 – 1.52                                     | 1450                                      | 3  | 2      | 1100   | 750  |
| 1.53 – 1.66                                     | 1600                                      | 4  | 2      | 1200   | 800  |
| 1.67 - 1.78                                     | 1750                                      | 5  | 2      | 1300   | 800  |
| 1.79 – 1.92                                     | 1800                                      | 2  | 3      | 1400   | 900  |
| 1.93 – 2.06                                     | 2000                                      | -  | 4      | 1500   | 1000   |
| 2.07 – 2.18                                     | 2150                                      | 1  | 4      | 1600   | 1050   |
| ≥ 2.19  | 2300                                      | 2  | 4      | 1750   | 1100   |

Tedavi sırasında doz uyarlamaları

#### Genel

CAPETABİN uygulanmasına bağlı toksisite, semptomatik tedavi ve/veya doz modifikasyonu (tedavinin kesilmesi ya da doz uyarlanması olarak) ile yönetilebilir. Doz bir kez azaltılırsa, daha sonra artırılmamalıdır.

Tedavi eden doktor tarafından, bu toksisitelerin ciddileşmediği veya hayatı tehdit edici olmadığı (örn. alopesi, tat alma bozukluğu, tırnakta şekil değişiklikleri, vb.) kararına varılırsa, tedaviye doz azaltılmadan veya kesilmeden aynı dozda devam edilebilir.

1.derece olaylarda doz modifikasyonları önerilmemektedir. Eğer 2. veya 3. derece advers etki oluşursa CAPETABİN tedavisi durdurulmalıdır. Eğer advers etki çözülürse veya yoğunluğu 1. dereceye gerilirse, CAPETABİN tedavisi tam doz ile veya aşağıda verilen bilgilere göre yeniden başlayabilir (Tablo 3). Eğer 4. derece advers etki oluşursa, tedavi kesilmeli veya olay çözümlene veya 1.dereceye gerileyene kadar durdurulmalıdır; tedavi daha sonra orijinal dozun % 50'si ile yeniden başlayabilir. CAPETABİN tedavisi gören hastalar, orta veya ağır şiddette

toksisite görüldüğünde, tedavinin durdurulması gerekliliği konusunda bilgilendirilmelidir. Toksisite nedeniyle alınamayan CAPETABİN dozları yeniden verilmemelidir.

Hematoloji: Başlangıç dönemindeki nötrofil sayımları  $<1.5 \times 10^9/L$  ve/veya trombosit sayımları  $<100 \times 10^9/L$  olan hastalar, CAPETABİN ile tedavi edilmemelidir. Eğer tedavi siklusu sırasında, 3. veya 4. derece hematolojik toksisiteye işaret eden beklenmeyen bir laboratuvar sonucu elde edilirse CAPETABİN tedavisi kesilmelidir.

CAPETABİN'e bağlı toksisite sonrasında önerilen doz uyarlamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 3. CAPETABİN Doz Azaltımı Şeması

| Toksisite, NCIC derecesi* | Bir tedavi siklusunda doz değişimleri  | Bir sonraki siklus için doz uyarlaması (başlangıç dozunun %'si) |
|---------------------------|--|---|
| 1. derece                 | Aynı dozda devam edilir  | Aynı dozda devam edilir   |
| 2. derece                 |  |   |
| 1. ortaya çıkış           | 0 - 1. dereceye gerileyinceye kadar tedaviye ara verilir   | % 100   |
| 2. ortaya çıkış           |  | % 75  |
| 3. ortaya çıkış           |  | % 50  |
| 4. ortaya çıkış           | Tedavi tamamen sonlandırılır   | Uygulanabilir değil   |
| 3. derece                 |  |   |
| 1. ortaya çıkış           | 0-1. dereceye gerileyinceye kadar tedaviye ara verilir   | % 75  |
| 2. ortaya çıkış           |  | % 50  |
| 3. ortaya çıkış           | Tedavi tamamen sonlandırılır   | Uygulanabilir değil   |
| 4. derece                 |  |   |
| 1. ortaya çıkış           | Tamamen sonlandırılır ya da eğer hastanın iyiliği için tedavisinin sürdürülmesi gerekiyor ise toksisite 0-1. dereceye gerileyinceye kadar tedaviye ara verilir | % 50  |
| 2. ortaya çıkış           | Tamamen sonlandırılır  | Uygulanabilir değil   |

\*El-ayak sendromu ve hiperbilirubinemi (bkz. Bölüm 4.4.) için Kanada Ulusal Kanser Enstitüsü Klinik Çalışma Grubu (KUKE KÇG) Ortak Toksisite Kriterleri (versiyon 1) veya Kanser Tedavisi Geliştirme Programı'nın Yan Etkiler İçin Genel Terminoloji Kriterleri (YEGTK), ABD Ulusal Kanser Enstitüsü, Versiyon 3 kullanılmıştır (bkz. Bölüm 4.4.)

#### Genel kombinasyon terapisi

CAPETABİN, diğer tedaviler ile kombine olarak kullanıldığında toksisiteler için doz modifikasyonları yukarıdaki Tablo 3'e ve diğer ajanlar için uygun reçete bilgilerine göre yapılmalıdır.

Tedavi siklusunun başlangıcında, eğer CAPETABİN veya diğer ajan(lar) tedavilerinden herhangi birinin ertelenmesi endikasyonu varsa, her iki ilaca da yeniden başlama şartları sağlanıncaya kadar, bütün ajanların kullanımı ertelenmelidir.

Tedavi siklusu sırasında, tedavi eden doktor tarafından, bu toksisitelerin CAPETABİN'e bağlı olmadığına karar verilirse, CAPETABİN'e devam edilmelidir ve diğer ajanların dozları uygun

reçete bilgisine göre ayarlanmalıdır.

Eğer diğer ajanlar kalıcı olarak bırakılacaksa, CAPETABİN için yeniden tedaviye başlama gereklilikleri karşılandığında, CAPETABİN tedavisine devam edilebilir.

Bu tavsiye tüm endikasyonlar ve tüm özel popülasyonlar için geçerlidir.

### **Uygulama şekli:**

Standart doz

CAPETABİN tabletleri yemekten sonraki 30 dakika içinde su ile yutulmalıdır.

### **Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler**

#### **Karaciğer yetmezliği:**

Karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda doz ayarlaması önerisi yapabilmek için mevcut güvenilirlik ve etkililik verileri yeterli değildir. Siroz veya hepatite bağlı karaciğer yetmezliği ile ilgili bilgi yoktur.

#### **Böbrek yetmezliği:**

Başlangıç döneminde orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 30-50 mL/dk [Cockroft ve Gault]), başlangıç dozunun (1250 mg/m<sup>2</sup>) % 25 azaltılması önerilir. Hafif derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (başlangıç döneminde kreatinin klerensi 51-80 mL/dk), başlangıç dozunda ayarlama yapılması önerilmemektedir.

Eğer hastada tedavi sırasında 2, 3 veya 4. derece istenmeyen olay ortaya çıkarsa, tedavinin derhal durdurulması, hastanın dikkatle gözlenmesi ve daha sonrasında ise, yukarıdaki tablo 3'de özetlendiği şekilde doz ayarlaması yapılması önerilir (bkz. Bölüm 5.2.). Eğer tedavi sırasında, hesaplanan kreatin klerensi 30 mL/dk'nın altına düşerse, CAPETABİN'e devam edilmemelidir. Orta derecede böbrek yetmezliğine yönelik bu doz ayarlama önerileri hem monoterapi hem de kombinasyon şeklinde kullanım için geçerlidir. Doz hesaplamaları için Tablo 1 ve 2'ye bakınız.

#### **Pediyatrik popülasyon:**

CAPETABİN'in çocuklardaki etkililik ve güvenliliği incelenmemiştir.

#### **Geriatrik popülasyon:**

CAPETABİN monoterapisi için başlangıç dozunun ayarlanması gerekmez. Ancak tedaviye bağlı ağır 3 veya 4. derece advers olaylar, 80 yaş ve üzerindeki hastalarda, daha genç hastalara kıyasla daha sık olmuştur.

CAPETABİN diğer ajanlarla kombinasyon halinde kullanıldığında, 3 ve 4. derece advers ilaç reaksiyonları (ADR) ve ilacın bırakılmasına sebep olan ADR'ları yaşlı hastalarda (≥ 65) genç hastalardan daha fazla yaşanmıştır. Yaşlı hastaların dikkatle izlenmesi önerilir.

Dosetaksel ile kombinasyonda: 60 yaş ve üzerindeki hastalarda, tedaviye bağlı 3 veya 4. derece advers olaylar ve tedaviye bağlı ciddi advers olayların insidansında artış gözlenmiştir. CAPETABİN – dosetaksel kombinasyonu ile tedavi edilen 60 yaş ve üzerindeki hastalar için, CAPETABİN başlangıç dozunun % 25 azaltılması (günde iki kez 950 mg/m<sup>2</sup>) önerilir. Doz hesaplamaları için Tablo 2'ye bakınız.

İrinotekan ile kombinasyonda: 65 yaş veya üzeri hastalar için CAPETABİN'in başlangıç

dozunun günde iki defa 800 mg/m<sup>2</sup>'ye azaltılması tavsiye edilir.

### 4.3 Kontrendikasyonlar

CAPETABİN, kapesitabin ya da yardımcı maddelerin herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

CAPETABİN, floropirimidin tedavisine karşı ağır ve beklenmeyen reaksiyon öyküsü olan hastalarda veya florourasile karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Diğer floroprimidinler gibi CAPETABİN, dihidropirimidin dehidrojenaz (DPD) eksikliği olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

CAPETABİN, gebelik ve laktasyonda, ağır lökopenisi, nötropenisi veya trombositopenisi olan hastalarda, ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir.

CAPETABİN, sorivudin veya kimyasal olarak ilişkili analogları (örn., brivudin gibi) ile birlikte eşzamanlı olarak kullanılmamalıdır (bkz. Bölüm 4.5).

CAPETABİN, ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 30 mL/dk'nın altında) kontrendikedir.

Eğer kontrendikasyonlar kombinasyon rejimindeki herhangi bir ajana bağlı olarak yaşıyorsa, bu ajan kullanılmamalıdır.

### 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Doz limitleyici toksisiteler:

Diyare, karın ağrısı, mide bulantısı, stomatit ve el-ayak sendromunu (el-ayak deri reaksiyonları, Palmar-Plantar Eritrodisestezi sendromu) içerir.

Özel kullanım uyarıları:

Diyare

CAPETABİN, bazen şiddetli olabilen diyareye yol açabilir. Şiddetli diyare hastaları dikkatle izlenmeli ve su kaybetmeleri halinde sıvı ve elektrolit replasmanı yapılmalıdır. Tıbbi açıdan uygun şekilde ve olabildiğince erken, standart diyare önleyici tedavilere (örn., loperamid) başlanmalıdır. KUKU KÇG (Kanada Ulusal Kanseri Enstitüsü Klinik Çalışma Grubu) 2. derece diyare, dışkının 4-6 dışkı/gün veya gece artması, 3. derece diyare, dışkının 7-9 dışkı/gün veya gece artması veya tutulamaması ve emilememesi olarak tanımlanabilir. 4. derece diyare, dışkı/günün  $\geq 10$  artması veya parlak kanlı diyaredir veya parenteral destek ihtiyacı duyulmasıdır. Gerekliğinde doz azaltılması yapılmalıdır (bkz. Bölüm 4.2.).

Dehidratasyon

Dehidratasyon başladığı anda önlenmeli ya da düzeltilmelidir. Anoreksi, asteni, bulantı, kusma ya da diyaresi olan hastalar hızla dehidrate olabilirler. Özellikle daha önce böbrek fonksiyonlarında bozulma bulunan hastalarda ya da CAPETABİN'in nefrotoksik ilaçlar ile eş zamanlı verildiği durumlarda, dehidratasyon akut böbrek yetmezliğine neden olabilir. 2. derece (ya da daha yüksek) dehidratasyon ortaya çıktığında, CAPETABİN tedavisine derhal

ara verilmeli ve dehidratasyon düzeltilmelidir. Hasta rehidrate edilinceye ve dehidratasyona zemin hazırlayan neden düzeltilinceye ya da kontrol altına alınıncaya değin, tedaviye yeniden başlanmamalıdır. Gerektiğinde aktive edici istenmeyen olaya yönelik, uygulanan doz modifikasyonları uygulamalıdır (bkz. Bölüm 4.2.).

#### El-ayak sendromu

CAPETABİN, kütanöz bir toksisite olan el-ayak sendromunu (Palmar-Plantar Eritrodisestezi veya kemoterapiyle indüklenen akral eritem) yol açabilir. Metastatik koşullarda CAPETABİN monoterapisi gören hastalarda, başlangıca kadar geçen medyan süre 79 gün (aralık: 11-360 gün) ve reaksiyon şiddeti 1-3. derece arasında olmuştur. 1. derece el ve ayak sendromu, el ve/veya ayaklarda uyuşmalar, dezestezi/parestezi, karıncalanma, ağrısız şişmeler ya da eritem ve/veya bu organlarda hastanın normal aktivitelerini bozmayan bir rahatsızlık hissidir. 2. derece el ve ayak sendromu, el ve/veya ayaklarda ağrılı eritem ve şişmeler ve/veya hastanın günlük yaşam aktivitelerini etkileyen bir rahatsızlık hissidir. 3. derece el ve ayak sendromu, el ve/veya ayaklarda nemli deskuamasyon, ülserasyon, bül oluşumu ve şiddetli ağrı ya da hastanın çalışamamasına veya günlük yaşam aktivitelerini yerine getirememesine yol açan şiddetli bir rahatsızlık hissidir. 2 ya da 3. derece el ve ayak sendromu ortaya çıktığında, bu durum iyileşinceye ya da 1. dereceye gerileyinceye kadar, CAPETABİN tedavisine ara verilmelidir. 3. derece el ve ayak sendromu sonrasında, izleyen CAPETABİN dozları azaltılmalıdır (bkz. Bölüm 4.2.). CAPETABİN ve sisleptatin kombine olarak kullanıldığında, B6 vitamininin (piridoksin) kullanımı, sisleptatinin etkinliğini azalttığı yönünde yayınlanan raporlar doğrultusunda, el ve ayak sendromunun semptomatik veya sekonder profilaktik tedavisinde tavsiye edilmez.

#### Kardiyotoksisite

CAPETABİN ile gözlenen kardiyotoksisite spektrumu, diğer floropirimidinlerin kardiyotoksisite spektrumuna benzerdir. Bunlar arasında miyokardiyal enfarktüs, angina, disritmiler, kardiyojenik şok, ani ölümler, ve elektrokardiyografik değişimler yer alır. Bu advers olaylar önceden koroner arter hastalığı hikayesi bulunan hastalarda daha yaygın olabilir. CAPETABİN alan hastalarda kardiyak aritmiler, anjina pektoris, miyokard infarktüsü, kalbin durması, kalp yetmezliği bildirilmiştir (bkz. Bölüm 4.8.).

#### Hipo veya hiperkalsemi

Kapesitabin tedavisi sırasında hipo veya hiperkalsemi bildirilmiştir. Önceden hipo veya hiperkalsemisi olan hastalarda dikkatli olunmalıdır (bkz. Bölüm 4.8.).

#### Santral veya periferik sinir sistemi hastalıkları

Santral veya periferik sinir sistemi hastalığı (beyin metastazı, nöropati) olan hastalarda dikkatli olunmalıdır (bkz. Bölüm 4.8.).

#### Diabetes mellitus veya elektrolit dengesizliği

CAPETABİN tedavisi sırasında kötüleşebileceklerinden, Diabetes mellitus veya elektrolit dengesizliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır (bkz. Bölüm 4.8.).

#### Kumarin antikoagülanlar

Bir ilaç etkileşim çalışmasında, tek doz varfarin uygulamasından sonra, S-varfarinin ortalama EAA değerinde belirgin bir artış (% 57) meydana gelmiştir. Bu sonuçlar, sitokrom P450 2C9 izoenzim sisteminin kapesitabin tarafından inhibisyonuna bağlı bir etkileşimin varlığını düşündürmektedir. CAPETABİN ile eş zamanlı olarak oral kumarin türevi antikoagülan alan hastalar, antikoagülan yanıt (Protrombin zamanı ya da INR) yönünden yakından izlenmeli ve

antikoagulan dozu bu doğrultuda uyarlanmalıdır (bkz. Bölüm 4.5).

#### Karaciğer yetmezliği

CAPETABİN'in karaciğer yetmezliği olan hastalarda etkililik ve güvenilirlik çalışmasının olmamasından dolayı, metastaz bulunup bulunmamasından bağımsız olarak düşük veya orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda CAPETABİN kullanımını dikkatlice izlenmelidir.

CAPETABİN hiperbilirubinemiye neden olabilir. Bilirubinde tedaviyle ilgili  $> 3.0x$  normal üst sınır artış veya karaciğer aminotransferazında (ALT, AST) tedaviyle ilgili  $> 2.5x$  normal üst sınır artış olursa CAPETABİN uygulamasına ara verilmelidir. Bilirubin  $\leq 3.0x$  normal üst sınır düzeyine veya karaciğer aminotransferazı  $\leq 2.5x$  normal üst sınır düzeyine düşerse tedaviye kaldığı yerden devam edilebilir. CAPETABİN ve dosetaksel kombinasyon kullanımı için Bölüm 4.2.'ye bakınız.

#### Böbrek yetmezliği

Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatin klerensi 30-50 mL/dk), genel popülasyon ile karşılaştırıldığında 3 veya 4. derece yan etkiler daha çok meydana gelir (bkz. Bölüm 4.2. ve 4.3.).

#### Dihidropirimidin dehidrojenaz (DPD) eksikliği

5-FU ile ilgili beklenmedik şiddetli toksisite (örn. stomatit, diyare, nötropeni ve nörotoksisite) nadiren DPD aktivitesinin eksikliğine bağlanmıştır. Bu nedenle, azalan DPD düzeyleri ile 5-FU'nun artan ve potansiyel olarak ölümcül toksik etkileri arasındaki bağlantı göz ardı edilemez. Bilinen DPD eksikliği olan hastalar CAPETABİN ile tedavi edilmemelidir (bkz. Bölüm 4.3).

#### Oftalmolojik komplikasyonlar

Hastalar özellikle önceden gelen göz bozukluğu hikayeleri de varsa, keratit ve kornea bozuklukları gibi oftalmolojik komplikasyonlar açısından dikkatlice izlenmelidir. Göz bozukluklarının tedavisi klinik olarak uygun görüldüğü şekilde başlatılmalıdır.

Ciddi deri reaksiyonları: CAPETABİN, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz gibi ciddi deri reaksiyonlarına neden olabilir. Tedavi sırasında ciddi bir deri reaksiyonu gözlemlenen hastalarda CAPETABİN kullanımı kalıcı olarak durdurulmalıdır.

#### Genel:

CAPETABİN ile tedavi edilen hastalar toksisiteye karşı dikkatle izlenmelidir. Çoğu advers olay normale dönebilir ve dozların kesilmesini veya azaltılmasını gerektirse de tedavinin kalıcı olarak bırakılmasını gerektirmez (bkz. Bölüm 4.2.).

Bu tıbbi ürün yardımcı madde olarak anhidr laktoz içerdiği için, galaktoz intoleransı, Lap-laktaz eksikliği, glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu ile ilgili kalıtsal problemleri olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdır.

1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermez". Sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.



#### 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

##### Kumarin antikoagülanlar

Varfarin ve fenprokumon gibi kumarin türevi antikoagülanlar ile eş zamanlı olarak kapesitabin alan hastalarda, koagülasyon parametrelerinde bozulmalar ve/veya kanama bildirilmiştir. Bu olaylar kapesitabin tedavisinin başlatılmasını izleyen birkaç gün içerisinde ve birkaç aya kadar; az sayıda olguda ise, kapesitabin kesildikten sonraki bir ay içerisinde ortaya çıkmıştır. Bir klinik farmakokinetik etkileşim çalışmasında, tek doz 20 mg varfarinden sonra, kapesitabin tedavisi S-varfarinin EAA değerini % 57 artırmış ve INR değeri de % 91 artmıştır. Bu sonuçlar, muhtemelen sitokrom P450 2C9 izoenzim sisteminin kapesitabin tarafından inhibisyonuna bağlı bir etkileşimin varlığını düşündürmektedir. Kapesitabin ile eş zamanlı olarak kumarin türevi antikoagülan alan hastalar, koagülasyon parametrelerindeki (Protrombin ya da INR) bozulmalar yönüyle düzenli olarak izlenmeli ve antikoagülan dozu bu doğrultuda uyarlanmalıdır.

##### Sitokrom P-450 2C9 substratları

Sitokrom P450 (CYP)2C9 izoenzimi tarafından metabolize edildiği bilinen diğer ilaçlar ile kapesitabin arasında ilaç-ilac etkileşim çalışması yürütülmemiştir. CAPETABİN bu tür ilaçlarla birlikte uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

##### Fenitoin

Kapesitabin ile fenitoinin birlikte kullanımı sırasında, plazma fenitoin konsantrasyonu yükselmeleri bildirilmiştir. Fenitoin ile ilaç-ilac etkileşim çalışması yürütülmemiş olup, ancak etkileşim mekanizmasının CYP2C9 izoenzim sisteminin kapesitabin ile inhibisyonu olduğu tahmin edilmektedir (*Bkz. Kumarin antikoagülanlar*). CAPETABİN ile eş zamanlı olarak fenitoin alan hastalar, yüksek fenitoin plazma konsantrasyonları yönünden düzenli olarak izlenmelidir.

##### İlaç gıda etkileşimi

Bütün klinik araştırmalarda, hastalar kapesitabini yemekten 30 dakika sonra almıştır. Bilinen güvenilirlik ve etkililik verileri besinlerle birlikte uygulama ile edinilen veriler olduğu için, CAPETABİN'in besinlerle birlikte alınması önerilmektedir.

##### Antiasit

Kanser hastalarında alüminyum hidroksit ve magnezyum hidroksit içeren bir antiasidin, kapesitabin farmakokinetiği üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Kapesitabin ve bir metabolitinin (5'-DFCR) plazma konsantrasyonlarında küçük bir artış söz konusudur; 3 majör metabolit (5'-DFUR, 5-FU ve FBAL) üzerinde ise herhangi bir etki bulunmamaktadır.

##### Lökovorin (LV) (folinik asit)

Kapesitabin ve folinik asit ile yapılan kombinasyon çalışması, folinik asidin kapesitabin ve metabolitlerinin farmakokinetiği üzerine majör bir etkisinin olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte, folinik asidin CAPETABİN'in farmakodinamiği üzerine etkisi vardır ve folinik asit tarafından toksisitesi artabilir: CAPETABİN'in tek başına maksimum tolere edilen dozu (MTD), aralıklı dozlama yapıldığında 3000 mg/m<sup>2</sup>/gün iken, CAPETABİN folinik asit ile (30 mg günde iki defa oral) kombine edildiğinde 2000 mg/m<sup>2</sup>/gün'dür.

##### Sorivudin ve analogları:

Literatürde sorivudin ve 5-FU arasında, dihidropirimidin dehidrojenazın sorivudin tarafından inhibisyonundan kaynaklanan, klinik olarak anlamlı bir ilaç-ilac etkileşimi tanımlanmıştır.

Floropirimidin toksisitesinde artışa yol açan bu etkileşim, fatal potansiyel taşır. Bu nedenle CAPETABİN, sorivudin ya da kimyasal yönden ilişkili olduğu brivudin gibi analogları ile birlikte aynı zamanda verilmemelidir (bkz. Bölüm 4.3). Sorivudin ya da kimyasal yönden ilişkili olduğu brivudin gibi analoglarıyla tedavinin bitimi ile CAPETABİN tedavisinin başlangıcı arasında en az 4 haftalık bir bekleme periyodu olmalıdır.

#### Radyoterapi

CAPETABİN, tek başına aralıklı dozlama şeklinde kullanıldığında maksimum tolere edilebilir dozu (MTD) günde 3000 mg/m<sup>2</sup> iken, rektal kanser için radyoterapi ile kombine edildiği durumlarda, devamlı veya günlük olarak Pazartesi'den Cuma'ya 6 haftalık radyoterapi kürü olarak kullanıldığında günde 2000 mg/m<sup>2</sup>'dir.

#### Okzaliptatin

Bevasizumab ile birlikte veya bevasizumab olmaksızın, kapesitabin ve okzaliptatin kombinasyonu uygulandığında, kapesitabin veya metabolitlerine, serbest platin veya toplam platine maruziyette klinik olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

#### Bevasizumab

Bevasizumabın, kapesitabin veya metabolitlerinin farmakokinetiği üzerine klinik olarak anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.

### **Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler**

#### **Pediyatrik popülasyon**

Pediyatrik popülasyona ilişkin hiçbir etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

#### **Geriatrik popülasyon**

Kapesitabin monoterapisi gören 60–79 yaş arası metastatik kolorektal kanser hastalarında gastrointestinal toksisitenin görülme oranı genel popülasyonda görülen ile benzer olmuştur. 80 yaş ve üzeri hastalarda ise, diyare, mide bulantısı ve kusma gibi geri dönüşümlü 3. veya 4. derece gastrointestinal advers olay oranı daha yüksektir (bkz. Bölüm 4.2.). Kapesitabin diğer ajanlarla kombinasyon halinde kullanıldığında, 3. ve 4. derece advers ilaç reaksiyonları ve ilacın bırakılmasına sebep olan advers ilaç reaksiyonları yaşlı hastalarda (≥65) genç hastalardan daha fazla yaşanmıştır. Kapesitabin artı dosetaksel kombinasyon tedavisi gören 60 yaş ve üzeri hastaların güvenlik verilerinin analizi; tedaviyle ilgili 3. ve 4. derece advers olayların, tedaviyle ilgili ciddi advers olayların ve advers olaylar nedeniyle tedaviden erken çekilmelerin görülme oranında 60 yaş altı hastalara kıyasla bir artış göstermiştir.

#### **Böbrek yetmezliği:**

Hekimler, böbrek fonksiyonu bozuk hastalara CAPETABİN uygulandığında dikkatli olmalıdır.

5-FU ile görüldüğü gibi, tedaviyle ilgili 3 veya 4. derece advers olayların görülme oranı, orta şiddette böbrek yetmezliği bulunan hastalarda daha yüksek bulunmuştur (kreatinin klerensi: 30-50 mL/dk.) (bkz. Bölüm 4.2.).

#### **Karaciğer yetmezliği:**

Karaciğer yetmezliği bulunan hastalar, CAPETABİN uygulandığında dikkatle izlenmelidir. Karaciğer metastazlarına veya şiddetli karaciğer yetmezliğine bağlı olmayan karaciğer yetmezliğinin kapesitabinin atılması üzerindeki etkileri bilinmemektedir (Bkz. Bölüm 5.2. ve

4.2.).

## 4.6 Gebelik ve laktasyon

### Genel tavsiye

#### Gebelik kategorisi: D

Kapesitabinin gebelik ve/veya fetus/yeni doğan üzerinde zararlı etkileri bulunmaktadır. CAPETABİN gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

#### Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (kontrasepsiyon)

Doğurgan kadınlar CAPETABİN tedavisi sırasında gebelikten kaçınmalarının gereği konusunda uyarılmalıdırlar.

#### Gebelik dönemi

Kapesitabin uygulanan gebelerle yapılmış herhangi bir çalışma yoktur, ancak kapesitabinin farmakolojik ve toksikolojik özelliklerine dayanarak, gebe kadınlara uygulandığı takdirde fetusa zararlı olabileceği tahmin edilmektedir. Hayvanlarda yürütülen üreme toksisitesi çalışmalarında, kapesitabin uygulaması embriyo letalite ve teratojenisiteye neden olmuştur. Bu bulgular, floropirimidin türevlerinin beklenen etkilerindedir. Kapesitabin potansiyel insan teratojeni olarak değerlendirilmelidir. CAPETABİN gebelik süresince kullanılmamalıdır. CAPETABİN gebelik süresince kullanılırsa veya hasta ilacı kullanırken hamile kalırsa, hasta fetusa yönelik potansiyel tehlikeden haberdar edilmelidir.

#### Laktasyon dönemi

İlacın, insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Laktasyonlu farelerde, kapesitabinin tek oral uygulamasını içeren bir çalışmada, sütte önemli miktarlarda kapesitabin metabolitleri bulunmuştur. Bu yüzden CAPETABİN tedavisi sırasında, emzirmenin kesilmesi gerekmektedir.

#### Üreme yeteneği/ Fertilité

Kapesitabinin fertilité üzerine etkisi ile ilgili veri bulunmamaktadır. Kadınlardan çocuk doğurma potansiyeli bulunanlar ve erkekler, çalışma süresince ve çalışmanın sonundaki makul bir süre için kabul edilebilir bir doğum kontrol metodu kullanmayı kabul etmeleri halinde kapesitabinin ana çalışmalarına katılmışlardır. Hayvan çalışmalarında fertilité üzerine etkiler gözlenmiştir (bkz. Bölüm 5.3).

## 4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Kapesitabinin araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde, küçük ya da orta dereceli etkileri vardır. CAPETABİN sersemlik, yorgunluk ve bulantıya sebep olabilir.

## 4.8 İstenmeyen etkiler

### a. Güvenlilik profilinin özeti

Kapesitabinin genel güvenlilik profili, monoterapi şeklinde kapesitabin tedavisi alan veya çok sayıda endikasyon için farklı kemoterapi rejimleriyle kombinasyon şeklinde kapesitabin alan 3000'den fazla hastadan elde edilen verilere dayanmaktadır. Metastatik meme kanseri, metastatik kolorektal kanser ve adjuvan kolon kanseri olan popülasyonlarda kapesitabin monoterapisinin güvenlilik profilleri benzerdir. Çalışma tasarımları ve önemli etkililik

bulguları dahil, önemli çalışmaların detayları için Bölüm 5.1'e bakınız.

En yaygın bildirilen ve/veya klinik açıdan önemli tedaviyle ilişkili advers ilaç reaksiyonları; gastrointestinal hastalıklar (özellikle ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı, stomatit), el ve ayak sendromu (Palmar-Plantar Eritrodisestezi), yorgunluk, asteni, anoreksi, kardiyotoksisite, daha önce kısıtlı böbrek fonksiyonu olanlarda böbrek disfonksiyonunun artması ve tromboz/emboli olmuştur.

b. Advers reaksiyonların tablo şeklinde özeti

Araştırmacı tarafından, kapesitabin uygulaması ile muhtemelen, olasılıkla veya uzaktan ilişkili kabul edilen advers reaksiyonlar, tek ajan olarak verilen kapesitabin için Tablo 4'te ve çok sayıda endikasyonda farklı kemoterapi rejimleriyle kombinasyon halinde verilen kapesitabin için Tablo 5'te sunulmaktadır. Advers reaksiyonları sıklıklarına göre sıralamak için aşağıdaki başlıklar kullanılmıştır: Çok yaygın ( $\geq 1/10$ ); yaygın ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ); yaygın olmayan ( $\geq 1/1,000$ ,  $< 1/100$ ); seyrek ( $\geq 1/10,000$ ,  $< 1/1,000$ ); çok seyrek ( $< 1/10,000$ ); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). Her sıklık grubunda, advers reaksiyonlar, azalan önem sırasında sunulmaktadır.

Kapesitabin monoterapisi:

Tablo 4'te; 1900'den fazla hastayı içeren üç önemli çalışmadan (M66001, SO14695 ve SO14796) sağlanan güvenilirlik verilerinin toplu bir analizine dayalı olarak, kapesitabin monoterapisinin kullanımı ile ilişkili advers reaksiyonlar listelenmektedir. Advers reaksiyonlar, toplu analizden sağlanan genel insidansa göre uygun sıklık grubuna eklenmiştir.

Tablo 4. Kapesitabin monoterapisi ile tedavi edilen hastalarda bildirilen ilişkili advers reaksiyonların özeti

| <b>Vücut Sistemi</b>                             | <b>Çok Yaygın</b><br><i>Tüm dereceler</i> | <b>Yaygın</b><br><i>Tüm dereceler</i>                                 | <b>Yaygın Olmayan</b><br><i>Şiddetli ve/veya yaşamı tehdit eden (derece 3-4) veya tıbbi olarak önemli kabul edilenler</i>   |
|--|---|---|---|
| <b>Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar</b>           | -   | Herpes virüsü enfeksiyonu, Nazofarenjit, Alt solunum yolu enfeksiyonu | Sepsis, İdrar yolu enfeksiyonu, Selülit, Tonsilit, Farenjit, Oral kandidiyaz, Grip, Gastroenterit, Mantar enfeksiyonu, Enfeksiyon, Diş apseleri                   |
| <b>Benign, malign ve belirlenememiş neoplazm</b> | -   | -   | Lipom   |
| <b>Kan ve lenf sistemi hastalıkları</b>          | -   | Nötropeni, Anemi  | Febril nötropeni, Pansitopeni, Granülositopeni, Trombositopeni, Lökopeni, Hemolitik anemi, Uluslararası Normalize Oranda (INR) artış / Protrombin zamanında uzama |
| <b>Bağışıklık sistemi</b>                        | -   | -   | Aşırı duyarlılık  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>hastalıkları</b>   |   |   |   |
| <b>Metabolizma ve beslenme hastalıkları</b>                   | Anoreksi                                      | Dehidrasyon, İştah kaybı, Kilo kaybı  | Diyabet, Hipokalemi, İştah bozukluğu, Malnütrisyon, Hipertrigliseridemi   |
| <b>Psikiyatrik hastalıklar</b>                                | -   | Uykusuzluk, Depresyon   | Konfüzyonel durum, Panik atak, Deprese duygudurum, Libido azalması  |
| <b>Sinir sistemi hastalıkları</b>                             | -   | Baş ağrısı, Letarji, Baş dönmesi, Parestezi, Tat alma duyusunda değişiklik  | Afazi, Bellek bozukluğu, Ataksi, Senkop, Denge bozukluğu, Duysal bozukluk, Periferik nöropati   |
| <b>Göz hastalıkları</b>                                       | -   | Lakrimasyonda artış, Konjonktivit, Göz iritasyonu   | Görme keskinliğinde azalma, Çift görme  |
| <b>Kulak ve iç kulak hastalıkları</b>                         | -   | -   | Vertigo, Kulak ağrısı   |
| <b>Kalp hastalıkları</b>                                      | -   | -   | Kararsız angina, Angina pektoris, Miyokard iskemisi, Atriyel fibrilasyon, Aritmi, Taşikardi, Sinüs taşikardisi, Çarpıntılar                               |
| <b>Vasküler hastalıklar</b>                                   | -   | Tromboflebit  | Derin ven trombozu, Hipertansiyon, Peteşi, Hipotansiyon, Sıcak basması, Periferik soğukluk  |
| <b>Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar</b> | -   | Dispne, Epistaksis, Öksürük, Rinore   | Pulmoner emboli, Pnömotoraks, Hemoptiz, Astım, Efor dispnesi  |
| <b>Gastrointestinal hastalıklar</b>                           | İshal, Kusma, Bulantı, Stomatit, Karın ağrısı | Gastrointestinal kanama, Kabızlık, Üst karın ağrısı, Dispepsi, Gaz, Ağız kuruluğu   | Barsak tıkanıklığı, Asit, Enterit, Gastrit, Disfaji, Alt karın ağrısı, Özofajit, Karında rahatsızlık, Gastroözofageal reflü hastalığı, Kolit, Dışkıda kan |
| <b>Hepato-biliyer hastalıklar</b>                             | -   | Hiperbilirubinemi, Karaciğer fonksiyon testi anormallikleri   | Sarılık   |
| <b>Deri ve deri altı dokusu hastalıkları</b>                  | Palmar-Plantar Eritrodisestezi sendromu       | Döküntü, Alopesi, Eritem, Deride kuruluk, Kaşıntı, Deride aşırı pigmentasyon, Maküler döküntü, Deri deskuamasyonu, Dermatit, Pigmentasyon hastalığı, Tırnak bozukluğu | Bül deri ülseri, Döküntü, Ürtiker, Işığa duyarlılık reaksiyonu, Palmar eritem, Yüzde şişme, Purpura, Radyasyon recall sendromu                            |

|   |                   |   |   |
|---|-------------------|---|---|
| <b>Kas iskelet ve bağ doku hastalıkları</b>                         | -                 | Ekstremitelerde ağrı, Sırt ağrısı, Artralji                 | Eklemlerde şişme, Kemik ağrısı, Yüz ağrısı, Kas iskelet sertliği, Kas zayıflığı |
| <b>Böbrek ve idrar hastalıkları</b>                                 | -                 | -   | Hidronefroz, İdrar kaçırma, Hematüri, Noktüri, Kan kreatinin düzeyinde artış    |
| <b>Üreme sistemi ve meme hastalıkları</b>                           | -                 | -   | Vajinal kanama  |
| <b>Genel hastalıklar ve uygulama bölgesi rahatsızlıkları</b>        | Yorgunluk, Asteni | Pireksi, Periferik ödem, Halsizlik / Kırıklık, Göğüs ağrısı | Ödem, Üşüme, Grip benzeri hastalık, Rigor, Vücut sıcaklığında artış             |
| <b>Yaralanma, zehirlenme ve prosedürle ilişkili komplikasyonlar</b> | -                 | -   | Doz aşımı   |

Kombinasyon tedavisinde kapesitabin:

Tablo 5'te; 3000'den fazla hastadan elde edilen güvenilirlik verilerine dayalı olarak, kapesitabinin çok sayıda endikasyonda farklı kemoterapi rejimleri ile kombinasyon halinde kullanılmasıyla ilişkili advers reaksiyonlar listelenmektedir. Advers reaksiyonlar, majör klinik çalışmalardan herhangi birinde görülen en yüksek insidansa göre uygun sıklık grubuna (Çok yaygın veya Yaygın) eklenmiştir ve yalnızca, kapesitabin monoterapisinde görülenlere **ek olarak** meydana gelmeleri veya kapesitabin monoterapisine kıyasla **daha yüksek sıklık grubunda** görülmeleri durumunda eklenmiştir (bkz. Tablo 4). Kombinasyon tedavisinde kapesitabin için bildirilen yaygın olmayan advers reaksiyonlar, kapesitabin monoterapisi için bildirilen veya kombinasyon ajanıyla monoterapi için bildirilen advers reaksiyonlarla tutarlıdır (literatürde ve/veya ilgili kısa ürün bilgilerinde).

Advers reaksiyonlardan bazıları, kombinasyon ajanıyla yaygın görülen reaksiyonlardır (örn; dosetaksel veya oksaliplatin ile periferik duysal nöropati, bevasizumab ile görülen hipertansiyon); bununla birlikte, kapesitabin tedavisiyle alevlenme olduğu göz ardı edilemez.

Tablo 5. Kombinasyon tedavisinde kapesitabin ile tedavi edilen hastalarda bildirilen, kapesitabin monoterapisiyle görülenlere **ek olarak** veya kapesitabin monoterapisine kıyasla **daha yüksek sıklık grubunda** görülen ilişkili advers reaksiyonların özeti

| <b>Vücut Sistemi</b>                   | <b>Çok Yaygın</b><br><i>Tüm dereceler</i>      | <b>Yaygın</b><br><i>Tüm dereceler</i>   |
|--|--|---|
| <b>Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar</b> | -  | Herpes zoster, İdrar yolu enfeksiyonu, Oral kandidiyaz, Üst solunum yolu enfeksiyonu, Rinit, Grip, <sup>+</sup> Enfeksiyon, Oral herpes |
| <b>Kan ve lenf sistemi</b>             | <sup>+</sup> Nötropeni, <sup>+</sup> Lökopeni, | Kemik iliği depresyonu, <sup>+</sup> Febril   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>hastalıkları</b>   | +Anemi, +Nötropenik ateş, Trombositopeni   | nötropeni   |
| <b>Bağışıklık sistemi hastalıkları</b>                        | -  | Aşırı duyarlılık  |
| <b>Metabolizma ve beslenme hastalıkları</b>                   | İştah azalması   | Hipokalemi, Hiponatremi, Hipomagnezemi, Hipokalsemi, Hiperglisemi   |
| <b>Psikiyatrik hastalıklar</b>                                | -  | Uyku bozukluğu, Anksiyete   |
| <b>Sinir sistemi hastalıkları</b>                             | Tat alma bozukluğu, Parestezi ve disestezi, Periferik nöropati, Periferik duysal nöropati, Tat alma duyusunda değişiklik, Baş ağrısı | Nörotoksisite, Tremor, Nevralji, Aşırı duyarlılık reaksiyonu, Hipoestezi  |
| <b>Göz hastalıkları</b>                                       | Lakrimasyonda artış  | Görme bozuklukları, Göz kuruluğu, Göz ağrısı, Görme kaybı, Bulanık görme  |
| <b>Kulak ve iç kulak hastalıkları</b>                         | -  | Kulak çınlaması, Hipoakuzi  |
| <b>Kalp hastalıkları</b>                                      | -  | Atriyel fibrilasyon, Kardiyak iskemi /enfarktüs   |
| <b>Vasküler hastalıklar</b>                                   | Alt ekstremitede ödem, Hipertansiyon, +Emboli ve tromboz   | Kızarma, Hipotansiyon, Hipertansif kriz, Sıcak basması, Flebit  |
| <b>Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar</b> | Boğaz ağrısı, Farenks disestezi  | Hıçkırık, Farengolarengeal ağrı, Ses kısıklığı  |
| <b>Gastrointestinal hastalıklar</b>                           | Kabızlık, Dispepsi   | Üst gastrointestinal kanama, Ağız ülserleri, Gastrit, Karında şişkinlik, Gastroözofageal reflü hastalığı, Oral ağrı, Disfaji, Rektal kanama, Alt karın ağrısı, Oral disestezi, Oral parestezi, Oral hipoestezi, Karında rahatsızlık |
| <b>Hepato-biliyer hastalıklar</b>                             | -  | Anormal karaciğer fonksiyonu  |
| <b>Deri ve deri altı dokusu hastalıkları</b>                  | Alopesi, Tırnak bozukluğu  | Hiperhidroz, Eritematöz döküntü, Ürtiker, Gece terlemeleri  |
| <b>Kas iskelet ve bağ doku hastalıkları</b>                   | Miyalji, Artralji, Ekstremitede ağrı   | Çene ağrısı, Kas spazmları, Çene kilitlenmesi, Kas zayıflığı  |
| <b>Böbrek ve idrar hastalıkları</b>                           | -  | Hematüri, Proteinüri, Renal kreatinin klirensinde azalma, Dizüri  |
| <b>Genel hastalıklar ve uygulama bölgesi rahatsızlıkları</b>  | Pireksi, Güçsüzlük, +Letarji, Sıcaklık intoleransı   | Mukoza enflamasyon, Bacak ağrısı, Ağrı, Üşüme, Göğüs ağrısı, Grip benzeri hastalık, +Ateş, İnfüzyonla ilişkili reaksiyon, Enjeksiyon bölgesi reaksiyonu, İnfüzyon bölgesinde ağrı, Enjeksiyon bölgesinde ağrı                       |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| <b>Yaralanma, zehirlenme ve prosedürle ilişkili komplikasyonlar</b> | - | Berelenme |
|---|---|-----------|

<sup>†</sup>Her terim için sıklık sayımında, tüm derecelerden advers reaksiyonlar temel alınmıştır. “<sup>††</sup>” ile işaretlenen terimler için sıklık sayımında derece 3-4 advers reaksiyonlar temel alınmıştır. Advers reaksiyonlar, majör kombinasyon çalışmalarının herhangi birinde görülen en yüksek insidansa göre eklenmiştir.

Pazarlama Sonrası Deneyimler:

Tablo 6. Pazarlama sonrası dönemde kapesitabin için raporlanan olayların özeti

| <b>Vücut Sistemi</b>                  | <b>Seyrek</b>  | <b>Çok Seyrek</b>   |
|---------------------------------------|--|---|
| Göz Hastalıkları                      | Gözyaşı kanalı darlığı,<br>Kornea hastalıkları, Keratit,<br>benekli keratit          |   |
| Kalp Hastalıkları                     | Ventriküler fibrilasyon, QT<br>uzaması, Torsade de Pointes,<br>Bradikardi, Vazospazm |   |
| Hepato-biliyer hastalıklar            | Karaciğer yetmezliği,<br>Kolestatik hepatit  |   |
| Deri ve deri altı dokusu hastalıkları | Deride lupus eritematozus  | Stevens-Johnson sendromu<br>ve Toksik epidermal nekroliz<br>gibi ciddi deri reaksiyonları<br>(bkz. Bölüm 4.4) |
| Böbrek ve idrar yolu hastalıkları     | Dehidratasyona sekonder<br>olarak akut böbrek<br>yetmezliği                          |   |

Aşağıdaki ilave ciddi advers reaksiyonlar, pazarlama sonrası maruz kalma döneminde belirlenmiştir:

- Çok seyrek: Lakrimal kanal stenozu
- Çok seyrek: Klinik çalışmalar ve pazarlama sonrası maruz kalma dönemi sırasında karaciğer yetmezliği ve kolestatik hepatit bildirilmiştir.
- Çok seyrek: Ventriküler fibrilasyon, QT uzaması, Torsade de Pointes ve bradikardi

c. Belli advers reaksiyonların tanımı

El ve ayak sendromu (EAS) (bkz. Bölüm 4.4):

Kapesitabin monoterapisi çalışmalarında (kolon kanserinde adjuvan tedaviyi, metastatik kolorektal kanser tedavisini ve meme kanseri tedavisini içerir) 3 haftada bir, 1. ila 14. günlerde günde iki kez 1250 mg/m<sup>2</sup>'lik kapesitabin dozu için tüm derecelerden EAS % 53 ila % 60 sıklığında gözlenmiş ve bu sıklık, metastatik meme kanserinin tedavisi için kapesitabin/dosetaksi kolunda % 63 olmuştur. Kapesitabin kombinasyon tedavisinde, 3 haftada bir 1. ila 14. günlerde günde iki kez 1000 mg/m<sup>2</sup>'lik kapesitabin dozu için tüm derecelerden EAS % 22 ila % 30 sıklığında gözlenmiştir.

Kapesitabin monoterapisi veya çok sayıda endikasyon (kolon kanseri, kolorektal kanser, mide



kanseri ve meme kanseri) için farklı kemoterapi rejimleriyle kombinasyon halinde kapesitabin tedavisi uygulanan 4700'den fazla hastaya ilişkin verilerin elde edildiği 14 klinik çalışmanın bir meta-analizi, kapesitabin tedavisine başlandıktan medyan 239 gün [% 95 GA 201, 288] sonra 2066 (% 43) hastada EAS (tüm derecelerden) oluştuğunu göstermiştir. Birlikte ele alınan tüm çalışmalarda, aşağıdaki eş değişkenler EAS gelişimi açısından yüksek bir riskle istatistiksel anlamlı ilişki göstermiştir: Kapesitabin başlangıç dozunun (gram) artırılması, kümülatif kapesitabin dozunun azaltılması (0.1\*kg), ilk altı haftada göreceli doz yoğunluğunu artırılması, çalışma tedavisi süresinin (hafta) artırılması, artan yaş (10 yıllık artışlarla), kadın cinsiyet ve başlangıçta iyi düzeyde ECOG performans durumu (0'a karşı  $\geq 1$ ).

İshal (bkz. Bölüm 4.4):

Kapesitabin, hastaların yaklaşık % 50'sinde gözlenen ishalin oluşmasına yol açabilir.

Kapesitabin ile tedavi edilen 4700'den fazla hastanın yer aldığı 14 klinik çalışmanın meta-analizine ait sonuçlar birlikte ele alındığında, tüm çalışmalarda aşağıdaki eş değişkenlerin ishal oluşumu açısından yüksek bir riskle istatistiksel anlamlı şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir: Kapesitabin başlangıç dozunun (gram) artırılması, çalışma tedavisi süresinin (hafta) artırılması, artan yaş (10 yıllık artışlarla) ve kadın cinsiyet. Aşağıdaki eş değişkenler, ishal oluşumu açısından düşük bir riskle istatistiksel anlamlı ilişki göstermiştir: Kümülatif kapesitabin dozunun artırılması (0.1\*kg) ve ilk altı haftada göreceli doz yoğunluğunun artırılması.

Kardiyotoksisite (bkz. Bölüm 4.4):

Tablo 4 ve 5'te açıklanan advers reaksiyonlara ek olarak, insidansı % 0.1'den az olan aşağıdaki advers reaksiyonlar, 949 hastayı kapsayan 7 klinik çalışmaya (metastatik kolorektal kanserde ve metastatik meme kanserinde 2 faz III ve 5 faz II klinik çalışma) ait klinik güvenilirlik verilerinin toplu bir analizi temelinde, kapesitabin monoterapisinin kullanılmasıyla ilişkili olmuştur: Kardiyomiyopati, kalp yetmezliği, ani ölüm ve ventriküler ekstrasistoller.

Ensefalopati:

Tablo 4 ve 5'te açıklanan advers reaksiyonlara ek olarak ve yukarıda belirtilen, 7 klinik çalışmanın klinik güvenilirlik verilerine ilişkin toplu analiz temelinde, % 0.1'den düşük bir insidansla ensefalopati, kapesitabin monoterapisinin kullanılmasıyla ilişkili olmuştur.

d. Özel popülasyonlar

Yaşlı hastalar (bkz. Bölüm 4.2)

Kapesitabin monoterapisiyle tedavi edilen  $\geq 60$  yaşındaki hastalara ait güvenilirlik verilerinin bir analizi ve kapesitabin artı dozetaksel kombinasyon tedavisi uygulanan hastaların bir analizi,  $< 60$  yaşındaki hastalara kıyasla tedavi ile ilişkili derece 3 ve 4 advers reaksiyonların ve tedavi ile ilişkili ciddi advers reaksiyonların insidansında bir artış olduğunu göstermiştir. Ayrıca, 60 yaşın altındaki hastalarla karşılaştırıldığında, kapesitabin artı dozetaksel ile tedavi edilen  $\geq 60$  yaşındaki daha fazla hasta advers reaksiyonlar nedeniyle tedaviyi erken dönemde bırakmıştır.

Kapesitabin ile tedavi edilen 4700'den fazla hastadan verilerin sağlandığı 14 klinik çalışmaya ilişkin bir meta-analizin sonuçları birlikte ele alındığında, tüm çalışmalarda, artan yaşın (10 yıllık artışlarla) EAS ve ishal oluşumu açısından yüksek bir riskle ve nötropeni oluşumu açısından düşük bir riskle istatistiksel anlamlı şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir.

## Cinsiyet

Kapesitabin ile tedavi edilen 4700'den fazla hastadan verilerin sağlandığı 14 klinik çalışmaya ilişkin bir meta-analiz sonuları birlikte ele alındığında, tm alıřmalarda, kadın cinsiyetin EAS ve ishal oluřumu aısından yksek bir riskle ve ntropeni oluřumu aısından dřk bir riskle istatistiksel anlamlı řekilde iliřkili olduėunu gstermiřtir.

Bbrek yetmezliėi olan hastalar (bkz. Blm 4.2, 4.4 ve 5.2)

Kapesitabin monoterapisiyle (kolorektal kanser) tedavi edilen, bařlangıta bbrek yetmezliėi olan hastalara ait gvenlilik verilerinin bir analizi; bbrek fonksiyonu normal olan hastalara kıyasla tedavi ile iliřkili derece 3 ve 4 advers reaksiyonların insidansında bir artıř olduėunu gstermiřtir (bbrek yetmezliėi olmayan hastalarda (n=268) % 36'ya karřı hafif bbrek yetmezliėi olanlarda (n=257) % 41 ve orta dzeyde bbrek yetmezliėi olanlarda (n=59) % 54 (bkz. Blm 5.2). Bbrek fonksiyonu orta dzeyde bozulmuř hastalarda doz azaltma oranı yksek (% 44) olurken, bu oranlar bbrek yetmezliėi olmayan veya hafif bbrek yetmezliėi olan hastalarda % 33 ve % 32 bulunmuřtur; tedaviyi erken dnemde bırakma oranlarında da artıř grlmř (ilk iki siklus sırasında % 21), bu oranlar bbrek yetmezliėi olmayan veya hafif bbrek yetmezliėi olan hastalarda % 5 ve % 8 olarak belirlenmiřtir.

## řpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası řpheli ila advers reaksiyonlarının raporlanması byk nem tařımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin srekli olarak izlenmesine olanak saėlar. Saėlık mesleėi mensuplarının herhangi bir řpheli advers reaksiyonu Trkiye Farmakovijilans Merkezi (TFAM)'ne bildirilmeleri gerekmektedir ([www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr): e-posta: [tufam@titck.gov.tr](mailto:tufam@titck.gov.tr), tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

## 4.9 Doz ařımı ve tedavisi

Akut doz ařımı belirtileri iinde bulantı, kusma, diyare, mukozit, gastrointestinal iritasyon ve kanama ve kemik iliėi depresyonu bulunur.

Doz ařımı durumunda tıbbi bakım, ortaya ıkan klinik belirtilerin dzeltilmesini ve bunların olası komplikasyonlarının nlenmesini amalayan, olaya zel, gerekli teraptik ve destekleyici tıbbi giriřimleri kapsamalıdır.

## 5. FARMAKOLOJİK ZELLİKLER

### 5.1 Farmakodinamik zellikler

Farmakoteraptik grubu: Sitostatik ajan  
ATC kodu: L01BC06

Etki mekanizması

Kapesitabin, oral olarak uygulanan, tmrde aktive olan ve tmre selektif sitotoksik bir ajan olarak tasarlanan bir floropirimidin karbamat trevidir.

Kapesitabin *in vitro* olarak non-sitotoksiktir. Fakat *in vivo* sitotoksik molekl 5-florourasile (5-FU) dnřr, bu madde de daha sonra metabolize edilir.

5-FU oluşumu, tercihen tümör bölgesinde tümörle ilgili anjiyojenik faktör timidin fosforilaz (dThdPase) ile katalizlenir ve bu sayede, sağlıklı dokuların sistemik 5-FU maruziyetini en aza indirir.

Kapesitabinin 5-FU'ya ardışık enzimatik biyotransformasyonu, tümör dokuları içinde daha yüksek 5-FU konsantrasyonlarına yol açar. Kolorektal kanser hastalarına oral olarak kapesitabin uygulamasının ardından (N=8), kolorektal tümör dokusundaki 5-FU konsantrasyonunun oranı komşu dokulardakine kıyasla 3.2 bulunmuştur (0.9 ile 8.0 aralığında). 5-FU konsantrasyon oranı tümörde, plazmaya karşılık 21.4 iken (3.9 ile 59.9 aralığında), sağlıklı dokularda plazmaya karşılık bu oran 8.9 bulunmuştur (3.0 ile 25.8 aralığında). Primer kolorektal tümördeki timidin fosforilaz aktivitesi, normal bir komşu dokununkinden 4 kez daha büyüktür.

Meme, mide, kolorektal, servikal ve yumurtalık kanseri gibi çeşitli insan tümörlerinde, ilgili normal dokulardakinden daha yüksek düzeyde timidin fosforilaz (5'-DFUR'u [5'- deoksi-5-floroüridin] 5-FU'ya çevirebilmektedir) bulunmaktadır.

Normal hücreler ve tümör hücreleri, 5-FU'yu 5-floro-2-deoksiüridin monofosfata (FdUMP) ve 5-floroüridin trifosfata (FUTP) metabolize eder. Bu metabolitler, hücrenin iki farklı mekanizma tarafından zarar görmesine neden olur. İlk olarak FdUMP ve folat kofaktörü, N<sup>5</sup>-<sup>10</sup>-metilentetrahidrofolat, kovalent olarak ternar kompleksi oluşturacak şekilde timidilat sentaza (TS) bağlanır. Bu bağlanma, urasilden timidilat oluşumunu engeller. Timidilat, DNA sentezi için gerekli olan timidin trifosfatın gerekli bir prekürsürüdür; dolayısıyla bu maddenin eksikliği, hücre bölünmesini engelleyebilir. İkinci olarak, nükleer transkripsiyonel enzimler RNA sentezi sırasında üridin trifosfat (UTP) yerine, yanlışlıkla FUTP ile birleşebilir. Bu metabolik hata, RNA işleme ve protein sentezini engelleyebilir.

## Klinik çalışmalar

### Kolon ve kolorektal kanser

#### Adjuvan kolon kanserinde kombinasyon terapisi

Evre III (Dukes C) kolon kanseri hastalarında yürütülen birçok merkezli, randomize, kontrollü faz 3 klinik çalışmadan elde edilen veriler, kapesitabinin oksaliplatin ile birlikte (XELOX) kolon kanserli hastalarda adjuvan tedavi olarak kullanımını desteklemektedir (NO16968 çalışması). Bu çalışmada, 944 hasta 24 hafta boyunca 3 haftalık döngüler halinde kapesitabin (2 hafta boyunca günde iki kez 1000 mg/m<sup>2</sup> ve ardından 1 hafta dinlenme süresi) ile kombine olarak oksaliplatin (3 haftada bir 1. günde 2 saatlik bir infüzyon olarak 130 mg/m<sup>2</sup>) tedavisine ve 942 hasta bolus 5-FU ve lökovorin tedavisine randomize edilmiştir. ITT (tedavi edilmesi amaçlanan) popülasyonda, primer analizde DFS bakımından, kapesitabinin 5-FU/LV'ye göre anlamlı olarak üstün olduğu gösterilmiştir (HR=0.80, %95 GA=[0.69; 0.93]; p=0.0045). 3 yıllık DFS oranı XELOX için % 71 iken, 5-FU/LV için % 67 olmuştur. Sekonder sonlanım noktası olan rekürrensiz sağkalımın (RFS) analizi, 0.78 risk oranı ile (% 95 GA=[0.67; 0.92]; p=0.0024) XELOX'a karşı 5-FU/LV için bu sonuçları desteklemektedir. XELOX, 0.87 risk oranı ile (% 95 GA=[0.72; 1.05]; p=0.1486) üstün genel sağkalıma doğru bir eğilim, diğer bir deyişle, ölüm riskinde % 13 azalma göstermiştir.

5 yıllık sağkalım XELOX için % 78 iken 5-FU/LV için % 74'dür. Sağlanan etkinlik verisi OS için 59 aylık ve DFS için 57 aylık medyan gözlem süresine dayanmaktadır.

## Monoterapi – Metastatik kolorektal kanser

Çok merkezli, randomize, kontrollü iki adet faz 3 klinik çalışmadan elde edilen veriler kapesitabinin metastatik kolorektal kanserinde, birinci basamak tedavi olarak kullanımını desteklemektedir (SO14695; SO14796). Bu çalışmalarda, 603 hasta kapesitabin ile (günde iki kez 2 hafta 1250 mg/m<sup>2</sup> ve ardından 1 hafta dinlenme süresi şeklinde 3 haftalık sikluslar) ve 604 hasta da 5-FU ve lökovorin ile (Mayo rejimi: 20 mg/m<sup>2</sup> lökovorin i.v. ve ardından 425 mg/m<sup>2</sup> i.v. bolus 5-FU, 1 ila 5. günlerde, her 28 günde bir) tedavi edilmek üzere randomize edilmiştir.

Tümü randomize edilen popülasyon içinde, toplam hedef cevap oranları (araştırmacının değerlendirmesi) % 25.7'ye (kapesitabin) karşılık % 16.7 (Mayo rejimi) bulunmuştur (p<0.0002). Progresyona kadar geçen medyan süre, 140 güne (kapesitabin) karşılık 144 gün (Mayo rejimi) olarak bulunmuştur. Medyan sağkalım, 392 güne (kapesitabin) karşılık 391 gündür (Mayo rejimi).

## Kombinasyon tedavisi – Birinci basamak kolorektal kanseri tedavisi

Çok merkezli, randomize, kontrollü bir faz 3 klinik çalışmadan (NO16966) elde edilen veriler, metastatik kolorektal kanserin birinci basamak tedavisinde, kapesitabinin oksaliplatin ve bevasizumab (BV) ile kombinasyon halinde kullanımını desteklemektedir. Çalışma iki bölüm içerir: XELOX veya FOLFOX-4'ü içeren hastaların iki değişik tedavi grubuna randomize edildiği ilk iki kollu bölüm ve onu takip eden XELOX + plasebo (P), FOLFOX-4+P, XELOX + BV, FOLFOX-4+BV'yi içeren dört farklı tedavi grubu ile 2x2 faktörlü bölüm. Bu tedavi rejimleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Tablo 6. Çalışma NO16966 tedavi rejimleri

|                                  | Tedavi                                      | Başlangıç dozu   | Tedavi şeması  |
|----------------------------------|---|--|--|
| FOLFOX-4<br>veya                 | Oksaliplatin<br>Lökovorin<br>5-Flourourasil | 85 mg/m <sup>2</sup> IV 2 saat<br>200 mg/m <sup>2</sup> IV 2 saat<br>400 mg/m <sup>2</sup> IV bolus<br>600 mg/m <sup>2</sup> IV 22<br>saat | Oksaliplatin her 2 haftanın 1. günü<br>Lökovorin her 2 haftanın 1. ve 2.<br>günü<br>5-flourourasil IV bolus/infüzyon her 2<br>haftanın 1. ve 2. günü |
| FOLFOX-4<br>+Bevasizumab<br>(BV) | Plasebo veya<br>Bevasizumab<br>(BV)         | 5 mg/kg 30-90<br>dakika  | FOLFOX-4 öncesi, her iki haftanın<br>birinci günü  |
| XELOX<br>veya                    | Oksaliplatin<br>Kapesitabin                 | 130 mg/m <sup>2</sup> IV 2 saat<br>1000 mg/m <sup>2</sup> oral<br>günde iki kez  | Oksaliplatin her 3 haftanın 1. günü<br>Kapesitabin oral günde iki kez 2<br>hafta (devamında 1 hafta tedavi<br>bırakılır)                             |
| XELOX +<br>Bevasizumab<br>(BV)   | Plasebo veya<br>Bevasizumab<br>(BV)         | 7.5 mg/kg IV 30-90<br>dakika   | Her 3 haftanın 1. günü XELOX<br>öncesi   |

5-flouroursil: IV bolus enjeksiyon lökovorinden hemen sonra

Hasta popülasyonunda ve tedavi edilmesi amaçlanan popülasyonda, progresyonsuz sağkalım (PFS) açısından yapılan karşılaştırmada XELOX kullanan kolda FOLFOX-4 kullanan kola eşdeğerlik (non-inferiorite) gösterilmiştir (aşağıdaki tabloya bakınız). Sonuçlar, OS bakımından XELOX'un FOLFOX-4'e eşdeğer olduğunu göstermiştir.

XELOX artı bevasizumabın, FOLFOX-4 artı bevasizumaba karşı bir karşılaştırması, önceden belirlenmiş bir araştırma analiziydi. Bu tedavi alt grubu karşılaştırmasında, PFS bakımından FOLFOX-4 artı bevasizumaba kıyasla XELOX artı bevasizumab, benzer idi (risk oranı 1.01 [% 97.5 GA 0.84, 1.22]). Tedavi edilmesi amaçlanan popülasyonda primer analizler zamanındaki ortalama izleme, 1.5 yıl idi; aynı zamanda izlemenin ilave 1 yılını takip eden analizlerden elde edilen veriler de aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.

Tablo 7. Primer analiz ve 1 yıllık takip verileri için anahtar yeterlilik sonuçları (Uygun Protokol Popülasyonu ve Tedavi Edilmesi Amaçlanan Popülasyon, Çalışma NO16966)

| PRIMER ANALİZ  |                                  |  |                           |
|--|----------------------------------|--|---------------------------|
| XELOX/XELOX +Plasebo/<br>XELOX +BV<br>(EPP*: N=967; ITT**: N=1017) |                                  | FOLFOX-4/FOLFOX-4+Plasebo/<br>FOLFOX-4+BV<br>(EPP*: N = 937; ITT**: N= 1017) |                           |
| Popülasyon   | Olaya Kadar Ortalama Zaman (Gün) |  | Risk Oranı<br>(% 97.5 GA) |
| Parametre: Progresyonsuz sağkalım                                  |                                  |  |                           |
| EPP  | 241                              | 259  | 1.05 (0.94; 1.18)         |
| ITT  | 244                              | 259  | 1.04 (0.93; 1.16)         |
| Parametre: Genel sağkalım  |                                  |  |                           |
| EPP  | 577                              | 549  | 0.97 (0.84; 1.14)         |
| ITT  | 581                              | 553  | 0.96 (0.83; 1.12)         |
| İLAVE 1 YILLIK İZLEME  |                                  |  |                           |
| Popülasyon   | Olaya Kadar Ortalama Zaman (Gün) |  | Risk Oranı<br>(% 97.5 GA) |
| Parametre: Progresyonsuz sağkalım                                  |                                  |  |                           |
| EPP  | 242                              | 259  | 1.02 (0.92; 1.14)         |
| ITT  | 244                              | 259  | 1.01 (0.91; 1.12)         |
| Parametre: Genel sağkalım  |                                  |  |                           |
| EPP  | 600                              | 594  | 1.00 (0.88; 1.13)         |
| ITT  | 602                              | 596  | 0.99 (0.88; 1.12)         |

\*EPP=seçilebilir hasta popülasyonu; \*\*ITT=tedavi edilmesi amaçlanan popülasyon

Bir randomize, kontrollü faz III çalışmasından (CAIRO) elde edilen veriler, metastatik kolorektal kanserli hastaların birinci basamak tedavisi için irinotekan ile kombinasyonda 2 haftalığına 3 haftada bir 1000 mg/m<sup>2</sup>'lik bir başlangıç dozunda kapesitabinin kullanımını destekler. Etkinlik, toplam yanıt oranı (ORR), progresyonsuz sağkalım (PFS) ve OS bakımından, 5-FU, lökovorin ve irinotekanın (FOLFIRI) pivotal çalışmalarında rapor edilenle benzerdi.

Çok merkezli, randomize, kontrollü bir faz II çalışmasının (AIO KRK 0604) bir interim analizinden elde edilen veriler, metastatik kolorektal kanserli hastaların birinci basamak tedavisi için irinotekan ve bevasizumab ile kombinasyonda 2 haftalığına 3 haftada bir 800 mg/m<sup>2</sup>'lik bir başlangıç dozunda kapesitabinin kullanımını destekler. İrinotekan (XELIRI) ve bevasizumab ile kombine edilmiş kapesitabin ile tedavi için 115 hasta randomize edildi: Kapesitabin (7 günlük bir dinlenme periyoduyla izlenen iki haftalığına günde iki defa 800 mg/m<sup>2</sup>), irinotekan (3 haftada bir 1. günde 30 dakikalık bir infüzyon olarak 200 mg/m<sup>2</sup>) ve bevasizumab (3 haftada bir 1. günde 30 ila 90 dakikalık bir infüzyon olarak 7.5 mg/kg);

toplam 118 hasta, oksaliplatin artı bevasizumab ile kombine edilmiş kapesitabin ile tedaviye randomize edildi: Kapesitabin (7 günlük bir dinlenme periyoduyla izlenen günde iki defa 1000 mg/m<sup>2</sup>), oksaliplatin (3 haftada bir 1. günde 2 saatlik bir infüzyon olarak 130 mg/m<sup>2</sup>) ve bevasizumab (3 haftada bir 1. günde 30 ila 90 dakikalık bir infüzyon olarak 7.5 mg/m<sup>2</sup>). Tedavi edilmesi amaçlanan popülasyonda 6 ayda progresyonsuz sağkalım, % 74'e (XELOX artı bevasizumab) karşı % 80 (XELIRI artı bevasizumab) idi. Toplam yanıt oranı (tam yanıt artı kısmi yanıt), % 45'e (XELOX artı bevasizumab) karşı % 47 (XELIRI artı bevasizumab) idi.

#### Kombinasyon Tedavisi - Kolorektal kanserin ikinci basamak tedavisi

Çok merkezli, randomize, kontrollü bir faz III klinik çalışmadan (NO16967) elde edilen veriler, metastatik kolorektal kanserin ikinci basamak tedavisinde, kapesitabinin oksaliplatin ile kombinasyon halinde kullanımını desteklemektedir. Bu çalışmada, önceden birinci basamak tedavisi olarak floropirimidin ile kombinasyon halinde irinotekan tedavi rejimi alan 627 metastatik kolorektal karsinomlu hasta XELOX yada FOLFOX-4 ile tedaviye randomize edilmiştir. XELOX ve FOLFOX-4'ün (plasebo veya bevasizumab eklemesi olmadan) dozlama takvimi için tablo 7'ye bakınız. Protokol popülasyonu ve tedavi edilmesi amaçlanan popülasyonun progresyonsuz sağkalım derecelerinde, XELOX'un FOLFOX-4'den daha aşağı olmadığı kanıtlanmıştır (aşağıdaki tabloya bakınız). Progresyonsuz sağkalım sonuçları OS sonuçları ile aynıdır. Tedavi edilmesi amaçlanan popülasyonda primer analizlerin zamanında ortalama izleme, 2.1 yıl idi; aynı zamanda izlemenin ilave bir 6 ayını takip eden analizlerden elde edilen veriler de, aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.

Tablo 8. Primer analizler ve 6 aylık takip verileri için yeterlilik anahtar etkinlik sonuçları (Protokol Popülasyonu, Çalışma NO16967) (Uygun Protokol Popülasyonu ve Tedavi edilmesi amaçlanan popülasyon)

| PRIMER ANALİZ                         |                                  |   |  |
|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| XELOX<br>(PPP*: N=251; ITT***: N=313) |                                  | FOLFOX-4<br>(PPP*: N = 252; ITT***: N= 314) |  |
| Popülasyon                            | Olaya Kadar Ortalama Zaman (Gün) |   | Risk Oranı<br>(% 95 GA)                |
| Parametre: Progresyonsuz sağkalım     |                                  |   |  |
| PPP                                   | 154                              | 168   | 1.03 (0.87; 1.24)                      |
| ITT                                   | 144                              | 146   | 0.97 (0.83; 1.14)                      |
| Parametre: Genel sağkalım             |                                  |   |  |
| PPP                                   | 388                              | 401   | 1.07 (0.88; 1.31)                      |
| ITT                                   | 363                              | 382   | 1.03 (0.87; 1.23)                      |
| İLAVE 6 AYLIK İZLEME                  |                                  |   |  |
| Popülasyon                            | Olaya Kadar Ortalama Zaman (Gün) |   | Risk Oranı<br>(% 95 GA)                |
| Parametre: Progresyonsuz sağkalım     |                                  |   |  |
| PPP ITT                               | 154<br>143                       | 166<br>146                                  | 1.04 (0.87; 1.24)<br>0.97 (0.83; 1.14) |
| Parametre: Genel sağkalım             |                                  |   |  |
| PPP                                   | 393                              | 402   | 1.05 (0.88; 1.27)                      |
| ITT                                   | 363                              | 382   | 1.02 (0.86; 1.21)                      |

\*PPP=Uygun protokol popülasyonu; \*\*ITT=tedavi edilmesi amaçlanan popülasyon

Birinci basamak (çalışma NO16966; başlangıç 2-kollu kısım) ve ikinci basamak tedavisinden (çalışma NO16967) etkinlik verilerinin havuzlanmış bir analizi, bağımsız çalışmalarda elde edildiği gibi, FOLFOX-4'e karşı XELOX'un eşdeğerlik sonuçlarını daha fazla desteklemektedir: 204 güne (FOLFOX-4; 500 hasta) karşı, 193 günlük (XELOX; 508 hasta) bir ortalama progresyonsuz sağkalım ile uygun protokol popülasyonunda progresyonsuz sağkalım (risk oranı 1.00 [% 95 gGA: 0.88; 1.14]). Sonuçlar, 478 güne (FOLFOX-4) karşı, 468 günlük (XELOX) bir ortalama OS ile OS bakımından XELOX'un FOLFOX-4'e eşdeğer olduğunu belirtmektedir (risk oranı 1.01 [% 95 GA: 0.87; 1.17]).

#### Kombinasyon tedavisi - Mide kanseri

Lokal ilerlemiş ya da metastatik mide kanserli hastalarla yapılan, çok merkezli, randomize, kontrollü bir faz 3 klinik çalışmadan elde edilen veriler, kapesitabinin lokal ilerlemiş ya da metastatik mide kanserinde birinci basamak tedavi olarak kullanımını desteklemektedir. Bu çalışmada, 160 hasta, kapesitabin (günde iki kez 2 hafta 1000 mg/m<sup>2</sup> ve ardından 7 günlük dinlenme süresi) ve sisplatin (her 3 haftada bir, 2 saatlik intravenöz infüzyon şeklinde 80 mg/m<sup>2</sup>) ile tedavi edilmek üzere randomize edilmiştir. Toplam 156 hasta 5-FU (her 3 haftada bir, 1. ve 5. günlerde sürekli infüzyon şeklinde, günde 800 mg/m<sup>2</sup>) ve sisplatin (her 3 haftada bir, 1. günde 2 saatlik intravenöz infüzyon şeklinde, 80 mg/m<sup>2</sup>) ile tedavi edilmek üzere randomize edilmiştir. Çalışmanın primer amacı karşılanmıştır; kapesitabinin sisplatin ile kombine kullanımında her bir protokol analizindeki progresyonsuz sağkalım, en az 5-FU'nun sisplatin ile kombine kullanımındaki kadardır. Sağkalım (OS) süresinin sonuçları, progresyonsuz sağkalımın sonuçları ile benzerdir (Aşağıdaki tabloya bakınız).

Tablo 9. Yeterlilik analizleri için anahtar etkinlik sonuçları (Protokol Popülasyonu, Çalışma ML17032)

| Parametre              | Ortalama (aylar) (% 95 GA)    |                        | Risk Oranı (% 95 GA)* |
|------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
|                        | Kapesitabin/Sisplatin (N=139) | 5-FU/Sisplatin (N=137) |                       |
| Progresyonsuz sağkalım | 5.6 (4.9, 7.3)                | 5.0 (4.2, 6.3)         | 0.81 (0.63, 1.04)     |
| Sağkalım süresi        | 10.5 (9.3, 11.2)              | 9.3 (7.4, 10.6)        | 0.85 (0.64, 1.13)     |

\* Siklooksijenaz (Cox) orantılı modelde ayarsız tedavi etkisi

#### Kolorektal ve lokal ilerlemiş mide kanseri: meta analizi

Altı klinik çalışmanın (çalışma SO14695, AO14796, M66001, NO16966, NO16967, M17032) bir meta analizi, gastrointestinal kanserin tek başına veya kombinasyon tedavilerinde kapesitabinin 5-FU'nun yerini alabileceğini desteklemiştir. Birleştirilmiş analizler kapesitabin içeren rejimler ile tedavi edilmiş 3097 hasta ve 5-FU taşıyan rejimler ile tedavi edilmiş 3074 hastayı içermektedir. Toplam sağ kalımda risk oranı 0.94 (% 95 GA: 0.89;1.00) kapesitabin içeren tedavilerin, 5-FU içeren tedavilerden olduğunu göstermiştir.

#### Kombinasyon tedavisi - Meme kanseri

Çok merkezli, randomize, kontrollü bir faz 3 klinik çalışmadan elde edilen veriler, antrasiklin içeren, sitotoksik bir kemoterapinin başarısız olmasından sonra lokal ilerlemiş veya metastatik

meme kanseri bulunan hastaların tedavisi için kapesitabinin dosetaksel ile birlikte kullanımını desteklemektedir. Bu çalışmada, 255 hasta kapesitabin (günde iki kez 2 hafta 1250 mg/m<sup>2</sup> ve ardından 1 hafta dinlenme süresi) ve dosetaksel (her 3 haftada bir, 1 saatlik intravenöz infüzyon şeklinde 75 mg/m<sup>2</sup>) ile tedavi edilmek üzere randomize edilmiştir. Toplam 256 hasta tek başına dosetaksel (her 3 haftada bir 1 saatlik intravenöz infüzyon şeklinde 100 mg/m<sup>2</sup>) ile tedavi edilmek üzere randomize edilmiştir. Sağkalım, kapesitabin +dosetaksel kombinasyonu kolunda daha yüksektir (p=0.0126). Medyan sağkalım 442 güne (kapesitabin +dosetaksel) karşılık 352 gün (tek başına dosetaksel) bulunmuştur. Tümü randomize edilen popülasyon içinde toplam hedef cevap oranları (araştırmacının değerlendirmesi) % 41.6'ya (kapesitabin +dosetaksel) karşılık, % 29.7 (tek başına dosetaksel) bulunmuştur (p=0.0058). Hastalığın progresyonuna veya ölüme kadar geçen süre, kapesitabin+dosetaksel kombinasyonu kolunda daha yüksektir (p<0.0001). Progresyona kadar geçen medyan süre 186 güne (kapesitabin +dosetaksel) karşılık 128 gün (tek başına dosetaksel) olarak bulunmuştur.

### Monoterapi - Meme kanseri

İki çok merkezli faz II klinik çalışmasından elde edilen veriler, bir taksan ve bir antrasiklin içeren kemoterapi rejimlerinin başarısız olmasının ardından lokal ilerlemiş ya da metastatik meme kanserli hastaların tedavisi ya da daha ileri antrasiklin terapisinin endike olmadığı kişiler için, kapesitabin monoterapisinin kullanımını desteklemektedir. Bu çalışmalarda toplam 236 hasta, kapesitabin (2 haftalığına günde iki defa 1250 mg/m<sup>2</sup> ve bunu izleyen bir haftalık dinlenme periyodu) ile tedavi edildi. Toplam objektif yanıt oranları (araştırmacı değerlendirmesi), % 20 (ilk çalışma) ve % 25 (ikinci çalışma) idi. İlerlemeye kadar geçen ortalama süre, 93 ve 98 gün idi. Ortalama sağkalım, 384 ve 373 gün idi.

## 5.2 Farmakokinetik Özellikleri

### Genel Özellikler

#### Emilim:

Oral uygulamadan sonra kapesitabin hızlı ve yaygın olarak emilir ve bunu 5'-deoksi-5-florositidin (5'-DFCR) ve 5'-deoksi-5-floroüridin (5'-DFUR) metabolitlerine yoğun bir dönüşüm izler. Gıda ile birlikte alınması kapesitabinin emilim hızını azaltsa da 5'-DFUR'nin ve 5-FU'nun EAA'sına etkisi çok azdır. 14. günde yemekten sonra 1250 mg/m<sup>2</sup> doz uygulandığında, kapesitabin, 5'-DFCR, 5'-DFUR, 5-FU ve FBAL'ın doruk plazma konsantrasyonları (C<sub>maks</sub>, mg/mL cinsinden), sırasıyla 4.47, 3.05, 12.1, 0.95 ve 5.46 olmuştur. Doruk plazma konsantrasyonlarına ulaşma zamanı (T<sub>maks</sub>, saat cinsinden) 1.50, 2.00, 2.00, 2.00 ve 3.34'tür. EAA<sub>0-sonsuz</sub> değerleri ise, µg.s/mL cinsinden 7.75, 7.24, 24.6, 2.03 ve 36.3 olmuştur.

#### Dağılım:

Proteine bağlanma: *In vitro* insan plazma çalışmalarında, kapesitabin, 5'-DFCR, 5'-DFUR ve 5-FU'nun başlıca albümin olmak üzere, plazma proteinlerine sırasıyla % 54, % 10, % 62 ve % 10 oranlarında bağlandıkları saptanmıştır.

#### Biyotransformasyon:

Kapesitabin önce hepatik karboksilesteraz ile 5'-DFCR'ye metabolize olur; bu madde ise daha sonra, başlıca karaciğer ve tümör dokularında bulunan sitidin deaminaz ile 5'-DFUR'ye dönüştürülür.



5-FU oluşumu, tercihen tümör bölgesinde, tümörle ilgili anjiyojenik faktör dThdPase ile meydana gelir ve bu sayede sağlıklı vücut dokularının sistemik 5-FU maruziyetini en aza indirir.

5-FU'nun plazmadaki EAA değeri, bir sonraki 5-FU i.v. bolusdan (600 mg/m<sup>2</sup> doz) sonra görülenden 6 ila 22 kez daha düşüktür. Kapesitabin metabolitleri, yalnızca 5-FU'ya ve 5-FU anabolitlerine dönüştükten sonra sitotoksik hale gelir (bkz. Bölüm 5.2.).

5-FU, dihidropirimidin dehidrojenaz (DPD) aracılığıyla daha da katabolize edilerek, hız kısıtlayıcı bir şekilde inaktif metabolitleri olan dihidro-5-florourasil (FUH<sub>2</sub>), 5-floro-üreidopropiyonik asit (FUPA) ve α-floro-β-alanine (FBAL) dönüşür.

#### Eliminasyon:

Eliminasyon yarı-ömrü (t<sub>1/2</sub> - saat cinsinden), kapesitabin, 5'-DFCR, 5'-DFUR, 5-FU ve FBAL için sırasıyla 0.85, 1.11, 0.66, 0.76 ve 3.23 olarak belirlenmiştir. Kapesitabinin farmakokinetiği 502-3514 mg/m<sup>2</sup>/gün doz aralığında değerlendirilmiştir. 1. ve 14. günlerde ölçülen kapesitabin parametreleri 5'-DFCR ve 5'-DFUR benzer bulunmuştur. 5-FU'nun EAA'nı, 14. günde % 30-35 daha yüksek bulunmuş, ancak sonra da artış göstermemiştir (22. gün). Terapötik dozlarda kapesitabinin ve metabolitlerinin farmakokinetiği, 5-FU dışında, dozla orantılıdır.

Oral uygulamadan sonra kapesitabin metabolitleri esasen idrarla atılırlar. Uygulanan kapesitabin dozu metabolitlerinin büyük kısmı (% 95.5) idrarda bulunur. Feçesle atılım minimaldir (% 2.6). İdrar ile atılan majör metabolit FBAL'dir ve uygulanan dozun % 57'sini temsil eder. Alınan dozun % 3 civarı, idrarda değişmemiş ilaç olarak atılmaktadır.

#### Kombinasyon tedavisi:

Kapesitabinin gerek dosetaksel gerekse paklitaksel farmakokinetiği üzerindeki etkilerinin ve bu iki ilacın kapesitabinin farmakokinetiği üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği faz I çalışmalarında, kapesitabinin dosetaksel ya da paklitaksel farmakokinetiği (C<sub>maks</sub> ve EAA) üzerinde etkisinin olmadığı ve dosetaksel ya da paklitakselin de 5'-DFUR (kapesitabinin en önemli metaboliti) farmakokinetiği üzerinde etkisinin bulunmadığı gösterilmiştir.

#### **Hastalardaki karakteristik özellikler**

Kolorektal kanserli 505 hasta üzerinde, günde iki kez 1250 mg/m<sup>2</sup> dozda kapesitabin tedavisi sonrası yapılan bir popülasyon farmakokinetiği analizinde, cinsiyet, başlangıç döneminde karaciğer metastazlarının olması ya da olmaması, Karnofsky Performans Statüsü, total bilirubin, serum albümini, AST ve ALT'nin, 5'-DFUR, 5-FU ve FBAL farmakokinetikleri üzerinde istatistik anlamlılık taşıyan bir etkisi bulunmadığı ortaya çıkmıştır.

#### Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer metastazları nedeniyle hafif ile orta derecede karaciğer yetmezliği olan kanser hastalarında, kapesitabinin biyoaktivasyonu ve farmakokinetikleri üzerinde klinik açıdan anlamlı bir etki gözlenmemiştir (bkz. Bölüm 4.2.). Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalara yönelik farmakokinetik veriler bulunmamaktadır.

#### Böbrek yetmezliği:

Hafif-ağır böbrek yetmezliği olan kanser hastaları üzerinde yapılan bir farmakokinetik çalışmaya göre, kreatinin klerensinin bozunmamış ilaç ve 5-FU farmakokinetiği üzerinde etkisi olduğuna yönelik veri bulunmamaktadır. Kreatinin klerensinin 5'-DFUR ve FBAL'nin

sistemik maruziyetini etkilediği bulunmuştur (kreatinin klerensi % 50 azaldığında 5'-DFUR ve FBAL'nin, EAA değerlerinde sırasıyla % 35 ve % 114 artış). FBAL antiproliferatif etkisi olmayan bir metabolittir. 5'-DFUR, 5-FU'nun direkt öncüsüdür (bkz. Bölüm 4.2.).

#### Yaşlı hastalar (65 yaş veya 65 yaşın üstünde):

Geniş bir yaş aralığındaki (27 ile 86 yaş) hastaları kapsayan ve 65 yaş ve üzerindeki 234 hastayı içeren (% 46) bir popülasyon farmakokinetiği analizinde, yaşın 5'-DFUR ve 5-FU farmakokinetiği üzerinde etkisi bulunmamıştır. FBAL'nin EAA değeri yaşla birlikte artmıştır (yaşta % 20'lik bir artış, FBAL'ın EAA'nında % 15'lik artış ile sonuçlanır). Bu artışın, böbrek fonksiyonlarındaki değişime bağlı olması olasıdır (bkz. Bölüm 4.2. ve 5.2.).

#### İrk:

Kapesitabinin 14 gün boyunca günde iki kere 825 mg/m<sup>2</sup> dozda oral uygulanmasının ardından, Japon hastalar (n=18) kapesitabin için beyaz ırktan hastalara (n=22) göre yaklaşık % 36 daha düşük C<sub>max</sub> ve % 24 daha düşük EAA değerleri sergilemiştir. Ayrıca, Japon hastalar FBAL için de beyaz ırktan hastalara göre yaklaşık % 25 daha düşük C<sub>max</sub> ve % 34 daha düşük AUC değerleri sergilemiştir. Bu farklılıkların klinik ilişkisi bilinmemektedir. Diğer metabolitlere (5'-DFCR, 5'-DFUR ve 5-FU) maruziyette önemli hiçbir farklılık meydana gelmemiştir.

### **5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri**

Tekrarlanan doz toksisitesi çalışmaları, sinomolgus maymunlarına ve farelere kapesitabinin günlük oral uygulaması, gastrointestinal, lenfoid ve hematopoetik sistem üzerinde floropirimidinlere özgü toksik etkiler ortaya çıkarmıştır. Bu toksisiteler geri dönüşümlü olmuştur. Kapesitabin ile, dejeneratif/regresif değişikliklerle karakterize deri toksisitesi gözlemlenmiştir. Kapesitabin hepatik ve CNS toksisitelerinden yoksundur. Sinomolgus maymunlarında, intravenöz uygulamadan (100 mg/kg) sonra kardiyovasküler toksisite (örneğin; PR- ve QT-aralığı uzaması) saptanabilmiş fakat tekrarlayan oral dozlamadan (1379 mg/m<sup>2</sup>/gün) sonra saptanamamıştır.

İki yıllık fare karsinogenisitesi çalışması, kapesitabin ile bir karsinogenisite kanıtı ortaya koymamıştır.

Standart fertilité çalışmaları süresince, kapesitabin alan dişi farelerde fertilité bozukluğu gözlemlenmiştir; fakat ilaçsız dönemden sonra bu etki geri dönüşümlü olmuştur. Ayrıca, 13-haftalık bir çalışma sırasında, erkek farenin üreme organlarında atrofik ve dejeneratif değişiklikler meydana gelmiş; fakat bu etkiler ilaçsız dönemden sonra geri dönüşümlü olmuştur (bakınız; bölüm 4.6). Farelerde yapılan embriyotoksisite ve teratojenite çalışmalarında, fetal rezorpsiyon ve teratojenitede dozla ilgili artışlar gözlemlenmiştir. Maymunlarda, yüksek dozlarda düşük ve embriyoletalite gözlemlenmiş, fakat teratojenite kanıtı bulunmamıştır.

Kapesitabin bakterilere (Ames testi) veya memeli hücrelerine (Çin hamsteri V79/HPRT gen mutasyonu analizi) *in vitro* mutajenik olmamıştır. Fakat kapesitabin, diğer nükleozid analoglarına (örneğin; 5-FU) benzer biçimde, insan lenfositlerinde (*in vitro*) klastojenik olmuş ve fare kemik iliğindeki mikronükleus testlerinde (*in vivo*) pozitif bir trend meydana gelmiştir.

## **6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ**

### **6.1 Yardımcı Maddelerin Listesi**

Anhidr laktoz  
Kroskarmelloz sodyum  
Hipromelloz  
Mikrokristal selüloz  
Magnezyum stearat

Opadry Pink:  
Hipromelloz  
Titanyum dioksit  
Polietilen glikol  
Demir oksit sarı  
Demir oksit kırmızı  
Talk

### **6.2 Geçimsizlikler**

Geçerli değil.

### **6.3 Raf ömrü**

24 ay

### **6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler**

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

### **6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği**

CAPETABİN 500 mg, 120 film kaplı tablet, blisterde.

### **6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler**

Özel bir gereklilik yoktur.

Tüm kullanılmayan ürün veya atık maddeler ulusal mevzuat doğrultusunda imha edilir.

## **7. RUHSAT SAHİBİ**

Dem İlaç San. ve Tic. A.Ş.,  
Dem Plaza İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No: 172  
34755 Ataşehir, İstanbul  
Tel: (0 216) 428 40 29  
Faks: (0 216) 428 40 86

## **8. RUHSAT NUMARASI**

2015/932

**9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ**

İlk ruhsat tarihi: 08.12.2015

Ruhsat yenileme tarihi:

**10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ**